Globotruncanidae | Heterohelicidae

| Core-section (interval in cm) | Sub-bottom depth (m) (water depth: 1328 m) | Frequency | Preservation | *Globotruncana renzi* | *G. coronata* | *G. paraconcavata* | *G. fornicata* | *G. sinuosa* | *G.* cf. *undulata* | *G.* cf. *concavata* | *G.* cf. *pseudolinneiana* | *Archaeoglobigerina* cf. *blowi* | *G. arca* | *G.* cf. *asymetrica* | *G. rosetta* | *G. stuartiformis* | *G. stephensoni* | *G. ventricosa* | *G. linneiana* | *G. bulloides* | *G. subspinosa* | *Rugoglobigerina rugosa* | *G. obliqua* | *G.* cf. *marieti* | *G. scutilla* | *Globotruncanella havanensis* | *Globotruncana falsostuarti* | *G. gagnebini* | *G. aegyptiaca* | *R. milamensis* | *G. trinidadensis* | *R.* cf. *scotti* | *R. hexacamerata* | *Abathomphalus mayaroensis* | *G. lamellosa* | *G. stuarti* | *G.* cf. *gansseri* | *G. contusa* | *G. insignis* | *G. conica* | *Globigerinelloides volutus* | *Globotruncana patelliformis* | *G.* cf. *elevata* | *G. galeoidis* | *Heterohelix* cf. *reussi* | *Ventilabrella eggeri* | *H. globulosa* | *Pseudotextularia elegans* | *H. pulchra* | *H. striata* | *H. planata* | *Pseudoguembelina costulata* | *H. pseudotessera* | *Pseudotextularia* sp. | *H.* sp. | *Planoglobulina carseyae* | *Gublerina robusta* | *G. cuvillieri* | *P. riograndensis* | *P. manuelensis* | *Pseudoguembelina kempensis* | *Pseudotextularia deformis* | *Racemiguembelina intermedia* | *R. fructicosa* | *Pseudoguembelina costata* | *H. semicostata* | *Planoglobulina brazoensis* | *P. acervulinoides* | *Pseudoguembelina palpebra* | *H. punctulata* | *Planoglobulina multicamerata* | *Pseudoguembelina* sp. | Subdivision based on planktonic foraminifers | Age |
|---|---|---